HERBICIDA
GRUPO B

NICO 75

GRÁNULOS DISPERSABLES

DELTA AGRO

Composición:

nicosulfuron 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoilsulfamoil)- N,N-dimetilnicotinamida	75 g
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100 cm^3

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA con el Nº 40.788

Nº de lote: 20220730
Fecha de Vencimiento: 2024/07/30
Origen: China
No inflamable

Contenido:
2 sobres de 150g c/u.

NOTA: no estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

Registrado por: Agroinsumos ByL S.A.
Pellegrini 205 2º Piso / Cañada de Gómez
Santa Fe / Argentina / 03471-422238 / www.agroinsumosbyl.com.ar

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO-CLASE III (CUIDADO).
INHALATORIA: CATEGORÍA II (NOCIVO).
IRRITACIÓN OCULAR: MODERADAMENTE IRRITANTE OCULAR-CATEGORÍA III (CUIDADO):
Causa irritación moderada a los ojos.
No irritante dermal. No sensibilizante.
No se conoce antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
· Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. - Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
· Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo - Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.
· Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
· Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727

HERBICIDA
GRUPO B

NICO 75

DELTA AGRO

GRÁNULOS DISPERSABLES

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: NICO 75 DELTA AGRO es un herbicida selectivo para el control de gramíneas anuales y perennes, y algunas malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz (híbridos indicados). La aplicación debe ser hecha sobre malezas emergidas en activo crecimiento. La absorción foliar es la principal vía de penetración en la planta.
Una vez aplicado, el producto es rápidamente absorbido por las hojas (principal vía de penetración) y raíces de las plantas, translocándose y movilizándose por xilema y floema hacia los tejidos meristemáticos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
NICO 75 DELTA AGRO Llene el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o tres cuartas partes de su volumen con agua, luego agregue la cantidad recomendada de **NICO 75 DELTA AGRO** con los agitadores en funcionamiento. Complete el tanque con agua hasta el volumen final deseado.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: su aplicación debe ser efectuada con equipos pulverizadores terrestres, de arrastre o motorizados, en cobertura total cuyos picos estarán provistos de pastillas de abanico. El caudal deberá ser de 100-150 l/ha, con una presión de trabajo de 60-80 libras/pulg^2 (4 a 5.5 bar). Debe aplicarse en la dosis recomendada diluida en 100 litros/ha de agua limpia.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
Maíz	Brachiaria (*Brachiaria spp.*)	50-70 g/ha	Al inicio del macollaje y hasta 5 cm de altura (*)
	Capín Arroz (*Echinochloa crus-galli*)	50-70 g/ha	A principio de macollaje (*)
	Nabo (*Brassica campestris*)	50 g/ha	En estado de roseta, entre 3 y 5 hojas (*)
	Pasto de Cuaresma ** (*Digitaria sanguinalis*)	50-70 g/ha	Con malezas pequeñas, desde 1 hoja hasta macollaje (diámetro de planta 4 cm). (**)
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense*)	70 g/ha	Cuando la maleza tenga de 20 a 40 cm de altura (*)
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*)	50 g/ha	Cuando la maleza tenga de 15 a 20 m de altura (*)
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	50 g/ha	Cuando la maleza tenga de 5 a 10 cm de altura (*)

(*)El cultivo debe encontrarse al momento de aplicación en el estado de 2 a 6 hojas verdaderas totalmente desplegadas. No considerar la primera hoja basal de ápice redondeado.
(**) Para el control de Digitaria sp. es necesario el agregado de sulfato de amonio (1,5 kg/ha) y aceite de soja al 85% (1,5 l/ha)

RESTRICCIONES DE USO: NICO 75 DELTA AGRO esta recomendado para el control de malezas solo en el cultivo de maíz. Luego de la aplicación, se deberá esperar de 5 a 7 días para escardillar. El control puede ser deficiente si se trata de malezas que están sufriendo estrés por sequía o bajas temperaturas (menos de 10ºC) o si se aplica en malezas cuyo estado excede el recomendado en el cuadro correspondiente.
Período de carencia: Maíz para forraje 30 días, Maíz grano 90 días.
"**En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia**".

Restricciones en la rotación de cultivos: Previo a su uso, se deberá tener en cuenta el plan de rotaciones y restricciones de siembra de otros cultivos distintos al maíz. Los lotes que hayan sido tratados con Nicosulfuron no podrán ser sembrados con otro cultivo que no sea Maíz, dentro de los siguientes períodos: Maíz: sin restricciones; centeno y trigo: 4 meses; avena, soja y poroto seco: 8 meses; sorgo, girasol, maní, alfalfa y trébol: 9 meses; cebada: 15 meses.

COMPATIBILIDAD: NICO 75 DELTA AGRO es compatible con la mayoría de los herbicidas. Se puede usar el Nicosulfuron en mezcla con 2,4 D, solo o sus combinaciones con dicamba o picloram, a las dosis indicadas en sus respectivos marbetes.
No aplicar a maíz tratado con insecticidas organofosforados, como clorpirifos o forato.
No aplicar a maíz sembrado en áreas donde el año anterior se trató soja con imazaquin.

FITOTOXICIDAD: Aplicado según las recomendaciones y dosis de uso expuestas no tiene efecto fitotóxico, aunque en algunas circunstancias se puede ver una pérdida del color verde intenso del cultivo, o un retraso temporario en su crecimiento, lo que no afectará el rendimiento.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

01/040788/SC2x150/AG/Rev 0